

PROGRAMME DE COLLES S14

NB : Au programme les suites particulières (cf S13) et les limites de fonctions :

LIMITES DE FONCTIONS

Propriétés fondamentales

Définition : Soient I un intervalle non trivial, $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ $a \in \overset{\circ}{I}$. On dit que f possède une **limite à gauche (resp. à droite)** au point a si la restriction de f à $J = I \cap]-\infty, a[$ (resp. $J = I \cap]a, +\infty[$) possède une limite en a .

Proposition.— Soient I un intervalle non trivial, $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in \overset{\circ}{I}$ un point à l'intérieur de I . Alors f admet une limite au point a ssi f admet $f(a)$ comme limite à gauche et à droite en a .

Théorème.— CARACTÉRISATION SÉQUENTIELLE DE LA LIMITE
Soient $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$, et $\ell \in \bar{\mathbb{R}}$. On a l'équivalence suivante :

$$\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \right) \iff (\forall u \in I^{\mathbb{N}}, \left(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n) = \ell \right))$$

Proposition.— Soient $f, g \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$. On suppose que f et g possèdent des limites au point a .

1. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, alors $f < g$ dans un voisinage de a .
2. Si $f \leq g$ au voisinage de a , alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Théorèmes d'existence de limites

- ↪ par opérations algébriques (valeur absolue, multiplication, produit, quotient)
- ↪ par composition (changement de variable)
- ↪ par encadrement ou comparaison (limite finie, limite nulle, limite infinie)
- ↪ cas des fonctions monotones (limites aux bornes de l'intervalle, à l'intérieur de l'intervalle)

Limites des fonctions usuelles

Théorème.— LIMITES DES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$$

$$\forall a \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \quad \lim_{x \rightarrow a} \tan x = \tan a, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty.$$

Théorème.— LIMITES DES FONCTIONS EXPONENTIELLE ET LOGARITHME NÉPÉRIEN

$$\begin{array}{lll} \mathbf{1.} & \forall a \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow a} \exp(x) = \exp(a) & \mathbf{2.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0 & \mathbf{3.} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty \\ \mathbf{1.} & \forall a \in \mathbb{R}^{+*}, \lim_{x \rightarrow a} \ln x = \ln a & \mathbf{2.} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty & \mathbf{3.} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \end{array}$$

Théorème.— LIMITES DE LA FONCTION PUISSANCE $\alpha \in \mathbb{R}^*$

$$\begin{aligned} & (\forall a \in \mathbb{R}^{+*}), \lim_{x \rightarrow a} x^\alpha = a^\alpha. \\ & \text{Si } \alpha > 0, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty. \\ & \text{Si } \alpha < 0, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0. \end{aligned}$$

COMPARAISON LOCALE DES FONCTIONS

Définitions

Proposition-définition — Soient $f, g \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$. On suppose que g ne s'annule pas dans $I \setminus \{a\}$. Alors

$$\begin{aligned} f = o_a(g) & \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0. \\ f \sim_a(g) & \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1. \end{aligned}$$

Règles de calculs pour les équivalents

Théorème.— Soient $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ et $\alpha \in \mathbb{R}^*$. On suppose que $f_1 \sim_a f_2$ et $g_1 \sim_a g_2$. Alors

1. $f_1 g_1 \sim_a f_2 g_2$.
2. si de plus $g_1 \neq 0$ et $g_2 \neq 0$ dans $I \setminus \{a\}$, alors $\frac{f_1}{g_1} \sim_a \frac{f_2}{g_2}$
3. si de plus $f_1 > 0$ et $f_2 > 0$ dans $I \setminus \{a\}$, alors $f_1^\alpha \sim_a f_2^\alpha$.
4. soit $h \in \mathcal{F}(J, \mathbb{R})$, telle que $h(J) \subset I$. Alors $\lim_{y \rightarrow b} h(y) = a \Rightarrow f_1 \circ h \sim_b f_2 \circ h$.
5. $(\forall h \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})), (f_1 = o_a(h) \Rightarrow f_2 = o_a(h))$

Théorème.— Soient $f, h \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$.

$$\boxed{\text{Si } h = o_a(f), \text{ alors } f + h \sim_a f.}$$

Proposition.— Soient $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$. On suppose qu'au voisinage de a , f_1 et g_1 sont strictement positives. Alors :

$$\text{Si } f_1 \sim_a f_2 \text{ et } g_1 \sim_a g_2, \text{ alors } f_1 + g_1 \sim_a f_2 + g_2.$$

Comparaison de fonctions usuelles

Théorème.— COMPARAISON DES FONCTIONS USUELLES

Soient $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^{+*}$ tels que $\alpha < \beta$, et $a > 1$, alors

| Au voisinage de 0 | Au voisinage de $+\infty$ |
|--|--|
| $(\ln x)^\gamma = o_0(1/x^\alpha).$ $x^\beta = o_0(x^\alpha)$ | $(\ln x)^\gamma = o_{+\infty}(x^\alpha)$ $x^\alpha = o_{+\infty}(x^\beta)$ $x^\alpha = o_{+\infty}(a^x)$ |

Théorème.— Au voisinage de 0, nous disposons des équivalents suivants :

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| • $\sin x \sim x$ | • $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ | • $\tan x \sim x$ |
| • $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ | • $\ln(1+x) \sim x$ | • $e^x - 1 \sim x$ |